

PROTOCOLO DE APLICACIÓN CULTIVO DE FRESA



1. Al momento de recibir la planta (raíces).

Realizar inmersión de raíces realizando una mezcla de:

PHC® T-22®200 gr/100 lts agua.

PHC® VAM PWI®1/2 lbr en agua suficiente para inmersión de planta para 1 ha.

*Aplicación de PHC® T-22® se realiza con el fin de evitar el ataque de hongos patógenos que afectan el desarrollo de la planta desde su sistema radicular o zona cortical del cuello como pueden ser *Fusarium sp.*, *Rhizoctonia sp.*, *Pythium sp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*.

*Aplicación de PHC® VAM PWI® para estimular el crecimiento de las raíces y con ello generar a la planta mayor resistencia al estrés por los cambios de temperatura y aumentar el vigor de la planta.

2. Aplicación en campo.

PRODUCTO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
PHC® T-22®	1 lb/ha	-1era. Aplicación a los 0-3 días después de Plantar. -2da. Aplicación a los 45 días. -3era. Aplicación a los 90 días.	Realizar 3 aplicaciones en el ciclo. En caso de que se tenga presencia de patógenos seguir con las aplicaciones con la Dosis de 1/2 libra por ha., como mantenimiento al cultivo. Aplicar por sistema de riego.
PHC® Yuccah®	1 galón/ha	Realizar aplicaciones desde inicio de cultivo con un intervalo de aplicación de 20-30 días	La aplicación se realiza con el fin de descompactar el suelo. Trabaja directamente sobre las sales lixiviándolas y si no se encuentran evita se acumulen.*Mejora la fauna microbiana por su contenido de azúcares. Aplicar por sistema de riego.

PRODUCTO	DOSIS	ENFERMEDAD A CONTROLAR	OBSERVACIONES
PHC® Milstop Plus®	Preventivo 2-3 gr/lit agua.	Botritis Mancha púrpura	*Aplicaciones foliares semanales cuando las condiciones para el desarrollo de la enfermedad sean favorables. Garantizar aplicación con máxima cobertura.
	Curativo 5 gr/lit agua.	Cenicilla	*Realizar aplicaciones foliares cada 10 días. *El producto no debe ser mezclado ya que ha sido preformulado para hacerlo más efectivo, de lo contrario su efecto se puede ver reducido.

4. Control y prevención de plagas.

PRODUCTO	DOSIS	PLAGA A CONTROLAR	OBSERVACIONES
PHC® Neeem®	1-2 lt/ha de agua	Ácaros	*La aplicación de tratamientos tempranos de PHC® Neeem® y PHC® Bug Balancer® ayudan a prevenir el desarrollo rápido de las poblaciones de adultos. Aplicar cada 10 días.
PHC® Bug Balancer®	1-2 lts/ha	Thrips	*Aleja insectos plaga nocivos para el cultivo y atrae insectos benéficos. Aplicar cada 10 días.



¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!

e-mail: phcmexico@mexis.com Tels: 52.56.28.39 y 52.86.97.02 Fax: 52.56.42.21
Localice a su Distribuidor Autorizado PHC más cercano: 01.(800).800.30.93